

**SIERPIEŃ** - dobiega końca okres pylenia roślin o klinicznym znaczeniu dla osób alergicznych. Z grupy o bardzo dużym i dużym zagrożeniu klinicznym pylić jeszcze będą babka, bylica i komosa, lecz stężenie pyłku tych roślin w okolicach Rabki raczej nie przekracza wartości średnich. Natomiast stężenie pyłku pokrzywy, należącej do grupy o średnim zagrożeniu klinicznym, w pierwszej połowie miesiąca może przekraczać wartości bardzo wysokie. Nadal dużej aktywności należy spodziewać się ze strony pleśni: stężenie zarodników *cladosporium* na pewno przekraczać będzie wartości bardzo wysokie, *penicilium* wysokie, a zarodniki *alternarii* wartości średnie.

Babka - pyli wczesnym rankiem, zarówno w dni pochmurne jak i słoneczne.

Bylica - pyli stosunkowo długo w ciągu doby - pomiędzy godz. 8 a 16, a jej pyłek wywołuje reakcje kliniczne już przy stężeniu 12 jed. W Rabce stężenie pyłku bylicy zalicza się do niskich.

Pokrzywa - jeden osobnik może wytworzyć około 100 tys. ziaren. Pokrzywę można spotkać w wilgotnych lasach, zaroślach, wysypiskach śmieci i innych siedliskach o wilgotnej glebie. W Rabce pylenie jest obfite, rozpoczyna się w pierwszych dniach maja i trwa przez 99 dni, do pierwszych dni września.

Komosa - najczęściej spotykana na poboczach dróg, rumowiskach, nad brzegami wód. Jeden osobnik może wytworzyć około 100 tys. ziaren. W Rabce pylenie rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i trwa przez 84 dni, do ostatnich dni września.

Zarodniki *penicillium* występują w Rabce przez cały rok, utrzymując w miarę wyrównane, średnie stężenie. Bez względu na porę roku, co kilkanaście dni liczba zarodników przekracza wartość średniego stężenia.

Zarodniki *cladosporium* występują w Rabce przez cały rok. Od stycznia do pierwszych dni maja stężenie zarodników jest bardzo niskie, natomiast od czerwca do końca listopada utrzymuje się stan wysoki.

Zarodniki *alternarii* nie występują przez cały rok. Praktycznie jest to okres pomiędzy 1 czerwca a 31 października, a średnie stężenie zarodników *alternarii* nie przekracza stopnia średniego (50jed.).